

# ASTRIX EC

Selectief na-opkomst herbicide o.a. in bietenteelt.  
Herbicide sélectif e.a. en culture de betteraves.



**5L**

**TOELATINGSNUMMER****WERKZAME STOF****GEHALTE****FORMULERINGSTYPE****AARD****ANTIGIFCENTRUM****BEVAT****ASTRIX EC**

8140P/B

FENMEDIFAM / PHENMÉDIPHAME

160 G/L

EMULGEERBAAR CONCENTRAAT (EC) / CONCENTRÉ ÉMULSIONNABLE (EC)

HERBICIDE

070/245.245

ISOPHORONE, INDEX 606-012-00-8;  
ISODÉCANOL, ÉTHOXYLÉ, CAS 61827-42-7**NUMÉRO D'AUTORISATION****MATIÈRE ACTIVE****TENEUR****TYPE DE FORMULATION****NATURE****CENTRE ANTIPOISONS****CONTIENT**

Product bestemd voor beroepsgebruik.

Produit destiné à un usage professionnel.

**GEVAAR/DANGER****GEVARENAANDUIDINGEN**

- H302 Schadelijk bij inslikken.  
 H312 Schadelijk bij contact met de huid.  
 H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.  
 H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.  
 H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.  
 H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN**

- P261 Inademing van damp/spuitnevel vermijden.  
 P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.  
 P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en geluutsbescherming dragen.  
 P301+P330 NA INSLIKKEN: De mond spoelen.  
 P391 Gelekt/bij gemorste stof opruimen.  
 P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.  
 P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  
 P308-P311 NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

**AANVULLENDE INFORMATIE**

- EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

**Verdeeld door / Distribué par:**

UPL Benelux BV  
 Claudius Prinsenlaan 144A  
 4818 CP Breda  
 The Netherlands  
 Tel. +31 (0)85 071 23 00

**Toelatingshouder/Détenteur de l'autorisation:**

UPL Europe Ltd.  
 The Centre (1 Floor), Birchwood Park  
 Warrington, Cheshire  
 WA3 6YN, UK

**INHOUD / CONTENU: 5 LTR**

GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK.  
 BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI.

2060920-01-2021

**MENTIONS D'AVERTISSEMENT**

- H302 Nocif en cas d'ingestion.  
 H312 Nocif par contact cutané.  
 H318 Provoque des lésions oculaires graves.  
 H335 Peut irriter les voies respiratoires.  
 H351 Susceptible de provoquer le cancer.  
 H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**CONSEILS DE PRUDENCE**

- P261 Éviter de respirer les vapeurs/aérosols.  
 P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  
 P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.  
 P301+P330 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche.  
 P391 Recueillir le produit répandu.  
 P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.  
 P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
 P308-P311 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

**INFORMATIONS ADDITIONNELLES**

- EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.



www.agrirecover.eu



8 717185 522945

NUMMER VAN DE PARTIJ: Zie elders op de verpakking  
 NUMERO DE LOT: Voir emballage

VORSTVRIJ EN OP EEN KOELE PLAATS BEWAREN.  
 CONSERVER A L'ABRI DU GEL DANS UN LOCAL FRAIS.

2200735 ELI. 2020-01 v01

## **NL** GEBRUIKSAANWIJZING

ASTRIX EC is een selectief na-opkomst herbicide ter bestrijding van eenjarige tweezaadlobbige onkruiden. Maximum 960 g fenmedifam/ha/12 maanden.

### **Toepassingen**

**Suiker- en voederbieten (kiembolstadium - 2 bladstadium (BBCH 10-12) tegen duizendknopigen (*Polygonum* spp./ 8 bladstadium (BBCH 10-18) tegen eenjarige tweezaadlobbige onkruiden):** In totaal maximum 6 l/ha Astrix EC per 12 maanden, toe te passen in een onkruidbestrijdingsschema, waarbij het product onder de vorm van een gefractioneerde behandeling wordt toegediend. Met de onkruidbestrijding dient begonnen te worden op kiemend onkruid; in de regel is dit bij opkomst van de bieten. Tussen de behandelingen dient een wachttijd van ongeveer 7-10 dagen in acht te worden genomen. Geadviseerd wordt Astrix EC te verspuiten in 200-400 ltr water per ha. Astrix EC kan worden gemengd met voor deze toepassing erkende herbiciden. De toepassing dient na opkomst van de bieten plaats te vinden en kan op diverse manieren uitgevoerd worden.

**Dosering:** 2-6 l/ha, eventueel gefractioneerd toepassen

a. Lage doseringssysteem: kort na opkomst van de bieten op zeer jonge onkruiden in het kiembolstadium: 0,5 l/ha Astrix EC + 0,5 l/ha metamitron (700g/l) + 0,5 l/ha ethofomesaat (200 g/l). Indien gewenst kan 0,5 l/ha (erkende) olie worden toegevoegd. De toepassing herhalen als nieuwe onkruiden aanwezig zijn. Als de onkruiden 1-2 echte blaadjes hebben of als minder gevoelige onkruiden voorkomen kunnen de doseringen met maximaal 100 % verhoogd worden.

b. In het twee-blad-stadium van de bieten: 3 l/ha Astrix EC + 1,5 l/ha metamitron (700 g/l). De toepassing zo nodig herhalen in het vierblad- stadium van de bieten.

c. In het twee-blad-stadium van de bieten: 3 l/ha Astrix EC + 1,5 l/ha ethofomesaat (200 g/l). De toepassing zo nodig herhalen in het vierblad- stadium van de bieten. Deze combinatie wordt vooral geadviseerd tegen veelknopigen en kleeftkruid.

d. Vanaf het twee-blad-stadium van de bieten (noodmaatregel): 6 l/ha Astrix EC, eventueel gefractioneerd.

### **Rode bieten (krotten) (open lucht):**

Toepassen na opkomst als de kiembolstadium van het gewas volledig zijn gestrekt. Toepassen vanaf kiembolstadium tot 2 bladstadium (BBCH 10-12) tegen duizendknopigen (*Polygonum* spp./ 8 bladstadium (BBCH 10-18) tegen eenjarige tweezaadlobbige onkruiden

**Dosering:** 2-6 l/ha Astrix EC, eventueel gefractioneerd.  
De hoogste dosering toepassen bij onkruiden met 1-2 echte blaadjes in 200-400 l/ha water.

### **Spinazie (open lucht):**

Toepassen na opkomst van het gewas (2-4 bladeren, BBCH 12-14). De toepassing kan enige gewasschade en opbrengstderiving veroorzaken.

**Dosering:** 3 l/ha Astrix EC, gefractioneerd toepassen met maximum 2 l/ha voor een toepassing.

### **Warmoes (open lucht):**

Toepassen na opkomst van het gewas (2-4 bladeren, BBCH 12-14).  
**Dosering:** 3 l/ha Astrix EC, gefractioneerd toepassen met maximum 2 l/ha voor een toepassing.

**Restricties:** Het gebruik in de teelt van warmoes is erkend op basis van een uitbreiding aangevraagd door derden. Er is voor deze uitbreiding geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitsonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze teelten komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

### **Aardbeien (open lucht):**

Toepassen in het selectie- en vermeerderingsveld: 14-21 dagen na het uitplanten, zodra de planten goed zijn aangeslagen.

Toepassen in het productieveld: 14-21 dagen na het uitplanten (zodra de planten goed zijn aangeslagen).

**Dosering:** 4-6 l/ha Astrix EC, eventueel gefractioneerd volgens de onkruiddruk.

**Restricties:** Niet toepassen in combinatie met andere middelen. Minimaal 3 dagen in acht nemen tussen de toepassing van Astrix EC en andere middelen.

### **Sierplanten (niet bestemd voor consumptie) onder bescherming en in open lucht:**

Toepassen tussen de rijen onder het gewas met een afschermpak.  
**Dosering:** 2-6 l/ha, eventueel gefractioneerd.

### **TOEPASSINGSVOORWAARDEN**

Spuut op een afgehard, droog en gezond gewas. Spuit niet op een gewas dat verzwakt is door insecten, stuifschade, nachtvorst of herbiciden. Spuit niet bij scherp, zonnig weer; in dit geval bij voorkeur 's avonds spuiten. Het sortiment in de sierteelt is zeer groot en de gevoeligheid voor dit middel kan zelfs binnen een soort nog variabel zijn. Raadpleeg voor meer informatie uw leverancier.

Minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek.

### **ANDERE VERMELDINGEN**

De erkende dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bij voorbeeld in onkruidbestrijdingsprogramma's met lage dosissen (FAR-systeem in bieten). Bij verlaging van de dosis is het niet toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn voor de oogst te verkorten.

SP0: Na de behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

SPe3: Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een minimale bufferzone van 1 m met klassieke techniek ten opzichte van oppervlaktewater niet behandelen.

De soorten en variëteiten van sierteelten die kunnen behandeld worden, worden op het etiket vermeld onder de verantwoordelijkheid van de houder van de erkenning.

## BEREIDEN VAN DE SPUITVLOEISTOF EN REINIGEN VAN DE SPUITAPPARATUUR

Spuut met grondig schoongemaakte apparatuur. Giet de helft van het benodigde water in de tank. Vermijd gebruik van kalk- of ijzerhoudend water. Voeg ASTRIX EC toe en zet het roersysteem in werking. Vul verder aan met de voorgeschreven hoeveelheid water. Laat de roerinrichting zowel tijdens het vullen van de tank als tijdens het spuiten in werking.

Spuut direct na het gereedmaken van de spuitvloeistof.

Na gebruik de spuitapparatuur zo snel mogelijk grondig reinigen. Het spuittoestel niet reinigen in de nabijheid van oppervlaktewater.

Zorg ervoor dat het water niet via de afvoer van erven of wegen kan worden verontreinigd.

Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte.

## EESTER-HULPMAATREGELEN

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

**NA INSLIKKEN:** De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

**NA INADEMING:** De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

**BIJ CONTACT MET DE HUID:** Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Met veel water en zeep wassen gedurende minstens 15 minuten. Draag, zo mogelijk, beschermende handschoenen bij het toedienen van eerste zorgen. Vermijd contact met besmette kledij en schoenen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Verontreinigde werkkleding mag de wruikruimte niet verlaten. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

**BIJ CONTACT MET DE OGEN:** Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Spoel WEG van het niet-aangetaste oog. Onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antifigicentrum **070/245.245**.

## VERNIETIGING VAN VERPAKKING EN BEHANDELINGSOVERSCHOTTEN

De ledige verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden door middel van een manueel systeem (drie opeenvolgende malen schudden met water) of door middel van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproeitoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sproeitank gegoten worden. De lege verpakking onbruikbaar maken en laten vernietigen via het erkend ophalingsysteem (AgriRecover). Spuitoverschotten minstens 10 maal verdunnen en verspuiten op het reeds behandelde perceel volgens de gebruiksvorschriften. Vijvers, waterlopen, beken en grachten, noch met middel, noch met de verpakking besmetten. De verpakking in geen geval herbruiken voor een ander doel.

## NOTA

Voor schaden voortvloeiende uit vervoer, opslag en gebruik van onze producten, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

## MODE D'EMPLOI

ASTRIX EC est un herbicide sélectif de post émergence pour lutter contre les dicotylées annuelles. Maximum 960 g de phenmédiphame/ha/12 mois.

### Applications

**Betteraves sucrières et fourragères (stade cotylédons - stade 2 feuilles (BBCH 10-12) contre les renouées (*Polygonum* spp.)/ stade 8 feuilles (BBCH 10-18) contre les dicotylées annuelles):**

Maximum 6 l/ha de ASTRIX EC au total par 12 mois, à appliquer dans un schéma de désherbage dans lequel le produit est appliqué sous forme de traitement fractionné. Le désherbage doit être entamé en début de germination des mauvaises herbes; en règle générale, cela correspond à la levée des betteraves. Un délai d'environ 7 à 10 jours doit être pris en compte entre chaque traitement. Il est conseillé de pulvériser ASTRIX EC dans 200 à 400 litres d'eau par ha.

ASTRIX EC peut être mélangé avec des herbicides agréés pour cette application. L'application doit être réalisée après la levée des betteraves et peut être exécutée de différentes manières.

**Dosage:** 2-6 l/ha, éventuellement fractionné.

- Programme par mini-doses, peu après la levée des betteraves, sur les mauvaises herbes dans le stade des cotylédons: 0,5 l/ha de ASTRIX EC + 0,5 l/ha métamitronne (700g/l) + 0,5 l/ha éthofumésate (200 g/l). Si souhaité, on peut ajouter 0,5 l/ha d'huile (agréée). Répéter l'application en présence de nouvelles mauvaises herbes. Si les mauvaises herbes ont 1 ou 2 vraies feuilles ou si des mauvaises herbes moins sensibles apparaissent, les dosages mentionnés ci-dessus peuvent être doublés.
- Au stade 2 feuilles des betteraves: 3 l/ha de ASTRIX EC + 1,5 l/ha métamitronne (700 g/l). Répéter l'application si nécessaire au stade 4 feuilles des betteraves.
- Au stade 2 feuilles des betteraves: 3 l/ha de ASTRIX EC + 1,5 l/ha éthofumésate (200 g/l). Répéter l'application si nécessaire au stade 4 feuilles des betteraves. Cette combinaison est surtout conseillée contre les polygonacées et le gaïlet.
- A partir du stade 2 feuilles des betteraves (mesure d'urgence): 6 l/ha de ASTRIX EC. L'application peut également s'effectuer de manière fractionnée.

### Betteraves rouges (plein air):

Appliquer après la levée, lorsque les cotylédons de la culture sont entièrement déployés. Appliquer du stade cotylédon au stade 2 feuilles (BBCH 10-12) contre les renouées (*Polygonum* spp.)/ stade 8 feuilles (BBCH 10-18) contre les dicotylées annuelles

**Dosage:** 2-6 l/ha de ASTRIX EC, éventuellement fractionné. Appliquer la dose maximale en cas de présence de mauvaises herbes avec 1 ou 2 vraies feuilles, dans 200 à 400 l/ha d'eau.

### Épinards (plein air):

Appliquer après la levée de la culture (2-4 feuilles, BBCH 12-14).

L'application peut provoquer quelques dommages à la culture et une perte de rendement. **Dosage:** 3 l/ha à fractionner, dont maximum 2 l/ha pour une des applications.



### **Bettes (plein air):**

Appliquer après la levée de la culture (2-4 feuilles, BBCH 12-14).

**Dosage:** 3 l/ha à fractionner, dont maximum 2 l/ha pour une des applications.

**Restrictions:** L'application en culture de bettes est reconnue à partir d'une demande faite par des tiers. Pour cet élargissement aucune recherche d'efficacité et de phytotoxicité du produit n'a été faite. C'est pour cette raison qu'il est recommandé de faire un essai de pulvérisation avant l'usage extensif. Le risque de l'utilisation de ce produit dans ces cultures revient à l'entière responsabilité de l'utilisateur.

### **Fraisiers (plein air):**

Appliquer dans le champ de sélection et de multiplication: 14 à 21 jours après le repiquage, dès que les plants se sont bien développés.

Appliquer dans le champ de production: 14 à 21 jours après le repiquage, dès que les plants se sont bien développés.

**Dosage:** 4-6 l/ha de Astrix EC, éventuellement fractionné en fonction des mauvaises herbes.

**Restrictions:** Ne pas appliquer en combinaison avec d'autres produits, attendre au moins 3 jours entre l'application de Astrix EC et celle d'autres produits.

### **Plantes ornementales (non destinées à la consommation) sous protection et plein air:**

Traitement des interlignes de la culture sans toucher la culture en place avec une cloche de protection..

**Dosage:** 2-6 l/ha éventuellement fractionné.

### **CONDITIONS D'APPLICATION**

Appliquer sur une culture bien implantée, sèche et saine. Ne pas appliquer sur une culture affaiblie par des insectes, pousières, gelées nocturnes ou herbicides. Ne pas appliquer en cas de fort ensoleillement; dans ce cas, appliquer de préférence le soir. La gamme des plantes ornementales est très grande et la sensibilité pour ce produit peut être variable, même au sein d'une espèce. Consultez votre fournisseur pour plus d'information.

Zone tampon minimale de 1m avec technique classique.

### **AUTRES MENTIONS**

La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les programmes de désherbage par mini-doses (FAR en betteraves). La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

SP0: Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement sec.

SPe3: Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée minimale de 1 m avec technique classique par rapport aux eaux de surface.

Les espèces et variétés de plantes ornementales susceptibles d'être traitées avec ce produit sont citées sur l'étiquette sous la responsabilité du détenteur de l'agrément.

### **MELANGER LE SPRAY ET NETTOYAGE DE L'ÉQUIPEMENT DE PULVÉRISATION**

Pulvériser avec un appareillage soigneusement rincé. Versez la moitié de l'eau nécessaire dans le réservoir. Éviter l'utilisation d'eau calcaireuse ou ferrugineuse. Ajoutez Astrix EC et enclenchez le mélangeur. Complétez en ajoutant le reste du volume d'eau prescrit. Laissez fonctionner le mélangeur, tant pendant le remplissage que pendant la pulvérisation. Rincer et nettoyer soigneusement le pulvérisateur après l'utilisation. Ne pas nettoyer le pulvérisateur à proximité des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes d'évacuation des eaux des cours de fermes ou des routes. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforce de calculer au mieux la quantité nécessaire en fonction de la superficie à traiter.

### **CONSEILS DE PREMIERS SECOURS**

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

**EN CAS D'INGESTION:** Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

**EN CAS D'INHALATION:** Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

**EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:** Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau et au savon pendant au moins 15 minutes. Porter si possible des gants de protection pour administrer les premiers secours. Éviter le contact avec les chaussures et les vêtements contaminés. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint. Appeler immédiatement le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons **070/245.245.**

### **DESTRUCTIONS DES EMBALLAGES ET DES SURPLUS DE TRAITEMENT**

L'emballage vide de ce produit doit être rincé suivant un système manuel (trois agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur. Les eaux de nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. Rendre l'emballage inutilisable et le faire détruire par l'intermédiaire de l'organisme de collecte d'emballage phyto agréé (AgriRecover). Diluer le surplus de traitement au moins 10 fois et appliquer sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les fosses avec le produit ou l'emballage vide. L'emballage ne peut, en aucun cas, être réutilisé à d'autres fins.

### **NOTE**

Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant du transport, du stockage et de l'utilisation de nos produits.



**TOELATINGSNUMMER****WERKZAME STOF****GEHALTE****FORMULERINGSTYPE****AARD****ANTIGIFCENTRUM****BEVAT****ASTRIX EC**

8140P/B

FENMEDIFAM / PHENMÉDIPHAME

160 G/L

EMULGEERBAAR CONCENTRAAT (EC) / CONCENTRÉ ÉMULSIONNABLE (EC)

HERBICIDE

070/245.245

ISOPHORONE, INDEX 606-012-00-8;  
ISODÉCANOL, ÉTHOXYLÉ, CAS 61827-42-7**NUMÉRO D'AUTORISATION****MATIÈRE ACTIVE****TENEUR****TYPE DE FORMULATION****NATURE****CENTRE ANTIPOISONS****CONTIENT**

Product bestemd voor beroepsgebruik.

Produit destiné à un usage professionnel.

**GEVAAR/DANGER****GEVARENAANDUIDINGEN**

- H302 Schadelijk bij inslikken.  
 H312 Schadelijk bij contact met de huid.  
 H318 Verorzaakt ernstig oogletsel.  
 H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.  
 H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.  
 H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN**

- P261 Inademing van damp/spuitnevel vermijden.  
 P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.  
 P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en geluutsbescherming dragen.  
 P301+P330 NA INSLIKKEN: De mond spoelen.  
 P391 Gelekt/b/gemorste stof opruimen.  
 P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.  
 P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  
 P308-P311 NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

**AANVULLENDE INFORMATIE**

- EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

**Verdeeld door / Distribué par:**

UPL Benelux BV  
 Claudius Prinsenlaan 144A  
 4818 CP Breda  
 The Netherlands  
 Tel. +31 (0)85 071 23 00

**Toelatingshouder/Détenteur de l'autorisation:**

UPL Europe Ltd.  
 The Centre (1 Floor), Birchwood Park  
 Warrington, Cheshire  
 WA3 6YN, UK

**MENTIONS D'AVERTISSEMENT**

- H302 Nocif en cas d'ingestion.  
 H312 Nocif par contact cutané.  
 H318 Provoque des lésions oculaires graves.  
 H335 Peut irriter les voies respiratoires.  
 H351 Susceptible de provoquer le cancer.  
 H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

**CONSEILS DE PRUDENCE**

- P261 Éviter de respirer les vapeurs/aérosols.  
 P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  
 P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.  
 P301+P330 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche.  
 P391 Recueillir le produit répandu.  
 P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.  
 P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
 P308-P311 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

**INFORMATIONS ADDITIONNELLES**

- EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.



www.agrirecover.eu

**INHOUD / CONTENU: 5 LTR**

GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK.  
 BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI.

2060920-01-2021



NUMMER VAN DE PARTIJ: Zie elders op de verpakking  
 NUMERO DE LOT: Voir emballage

VORSTVRIJ EN OP EEN KOELE PLAATS BEWAREN.  
 CONSERVER A L'ABRI DU GEL DANS UN LOCAL FRAIS.



